

## 治疗优点和缺点

### 所有冠状动脉疾病患者一般信息

重要说明: 无论你做何选择, 将总会为你提供药物处方。请查阅下方各表格比较治疗方案

	<b>CABG + 药物</b>	<b>PCI + 药物</b>	<b>仅药物</b>
<b>潜在好处/优点有哪些?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>与不治疗相比:               <ul style="list-style-type: none"> <li>活得更久</li> <li>减轻胸痛</li> </ul> </li> <li>可一次治疗多条狭窄动脉</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>与不治疗相比:               <ul style="list-style-type: none"> <li>活得更久</li> <li>减轻胸痛</li> </ul> </li> <li>可一次治疗多条狭窄动脉</li> <li>有时可在<a href="#">血管造影</a>同一预约/时间完成</li> <li>无需大手术或住院一晚</li> <li>通常可在治疗后 1 周内恢复正常工作</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>与不治疗相比:               <ul style="list-style-type: none"> <li>活得更久</li> <li>减轻胸痛</li> </ul> </li> <li>有助于控制胆固醇、血栓和血压</li> <li>无需住院治疗/程序</li> <li>通常可以立即恢复工作和日常生活</li> <li>可立即配药并开始治疗 (无等待时间)</li> <li>在稳定的 CAD 中可以与 PCI + 药物一样有效<sup>1</sup></li> </ul>
<b>潜在风险/缺点有哪些?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>等待时间: 可能要等数周到数月才能治疗</li> <li>涉及全身麻醉 (你会失去意识, 感觉不到疼痛)</li> <li>恢复时间 (约 6-12 周)</li> <li>涉及住院 (约 1 周)</li> <li>个人费用: 家庭护理、药物、旅行时间、误工时间</li> <li>健康风险:               <ul style="list-style-type: none"> <li>中风</li> <li>感染</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>等待时间: 可能要等几天到几周才能治疗</li> <li>涉及镇静 (你会有意识但不会感到疼痛)</li> <li>恢复时间 (约 1 天)</li> <li>涉及住院 (约 1 天)</li> <li>个人费用: 药物、旅行时间、误工时间</li> <li>健康风险:               <ul style="list-style-type: none"> <li>血栓</li> <li>动脉再狭窄 (可能</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>个人费用: 药物、旅行时间、误工时间</li> <li>健康风险:               <ul style="list-style-type: none"> <li>症状和疾病可能会恶化, 后续可能需要 PCI 或手术</li> <li>心脏病</li> <li>中风</li> <li>流血</li> <li>药物类型特有的副作用</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 肾脏病</li> <li>○ 心脏病</li> <li>○ 短期记忆问题</li> <li>○ 动脉再狭窄（可能需要另行手术或 PCI 治疗）</li> <li>○ 死亡</li> <li>○ 药物类型特有的副作用</li> </ul>	<p>需要多次治疗)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 肾脏病</li> <li>○ 心脏病</li> <li>○ 冠状动脉损伤</li> <li>○ 药物类型特有的副作用</li> </ul>	
--	---	---	--

<sup>1</sup><https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa070829>