

## مزایا و معایب درمان اطلاعات برای بیماران دیابت و بیماری سرخرگ کرونری

نکته مهم: هر گزینه درمانی را که انتخاب کنید، به شما نسخه دارو داده خواهد شد. برای مقایسه گزینه های درمانی با هم، به هر یک از جدولهای زیر رجوع نمایید.

فقط تجویز داروها	PCI + داروها	CABG + داروها	فواید/مزیت های بالقوه
الف) دلالت ندارد ب) 88% از بیماران زنده هستند	الف) 85% بیماران زنده هستند ب) 89% بیماران زنده هستند	الف) 90% بیماران زنده هستند ب) 88% بیماران زنده هستند	<p><b>زندگی طولانی تر</b></p> <p>الف) سه سال پس از معالجه بیماری سرخرگ کرونری هنگامیکه <b>چند رگ خونی</b> رساننده قلب مسدود/تنگ شده اند، تعداد بیشتری از بیماران که با CABG درمان شده اند در مقایسه با PCI زنده می مانند <b>1</b></p> <p>ب) پنج سال پس از معالجه بیماری سرخرگ کرونری هنگامیکه <b>فقط 1-2 رگ خونی</b> رساننده قلب تنگ/مسدود شده اند، تفاوتی بین درصد زنده ماند بیماران در نتیجه هر کدام از معالجه ها وجود ندارد <b>2</b></p>

فقط تجویز داروها	PCI + داروها	CABG + داروها	فواید/مزیت های بالقوه
دلالت ندارد	74% از بیماران آنژین ندارند	79% از بیماران آنژین ندارند	<p><b>آنژین کمتر (درد در ناحیه قفسه سینه)</b></p> <p>پنج سال پس از معالجه بیماری سرخرگ کرونری <b>هنگامیکه چند رگ خونی</b> رساننده قلب مسدود/تنگ شده اند، تعداد بیشتری از بیماران که با CABG درمان شده اند در مقایسه با PCI بدون آنژین می باشند <b>3</b></p>
15% از بیماران دچار حمله قلبی شدند	14% از بیماران دچار حمله قلبی شدند	7% از بیماران دچار حمله قلبی شدند	<p><b>امکان وقوع حمله قلبی</b></p> <p>پنج سال پس از معالجه بیماری سرخرگ کرونری <b>هنگامیکه چند رگ خونی</b> رساننده قلب مسدود/تنگ شده اند، تعداد کمتری از بیماران پس از درمان با CABG در مقایسه با PCI یا فقط تجویز دارو، دچار حمله قلبی می شوند <b>2</b></p>

فقط تجویز داروها	PCI + داروها	CABG + داروها	فواید/مزیت های بالقوه
دلالت ندارد	13% از بیماران احتیاج به معالجه مجدد داشتند (PCI یا CABG)	5% از بیماران احتیاج به معالجه مجدد داشتند (CABG یا PCI)	<p>احتمال نیاز به معالجه مجدد با PCI یا CABG</p> <p>سه سال پس از معالجه بیماری سرخرگ کرونری <b>هنگامیکه چند رگ خونی</b> رساننده قلب مسدود/تنگ شده اند، تعداد کمتری از افراد پس از درمان با CABG در مقایسه با PCI احتیاج به معالجه مجدد داشتند <b>4</b></p>
دلالت ندارد	بیماران بهبودی بیشتری در توانایی های ذهنی و جسمی خود را در <b>ماه اول</b> پس از PCI در مقایسه با CABG گزارش دادند	بیماران بهبودی بیشتری در توانایی های ذهنی و جسمی خود را <b>5 سال</b> پس از CABG در مقایسه با PCI گزارش دادند	کیفیت زندگی <b>2</b>

فقط تجویز داروها	PCI + داروها	CABG + داروها	ریسک ها/معایب احتمالی
3% از بیماران دچار سکته شدند	3% از بیماران دچار سکته شدند	4% از بیماران دچار سکته شدند	<p>امکان سکته کردن پنج سال پس از معالجه بیماری سرخرگ کرونری <b>هنگامیکه چند رگ خونی</b> رساننده قلب مسدود/تنگ شده اند، تعداد بیشتری از بیماران پس از درمان با CABG در مقایسه با PCI یا فقط تجویز دارو، دچار سکته شدند</p> <p style="text-align: right;"><b>2</b></p>

فقط تجویز داروها	PCI + داروها	CABG + داروها	ریسک‌ها/معایب احتمالی
<p>شما باید با پزشک خود درباره ریسک‌ها و عوارض جانبی داروها صحبت کنید</p>	<p>شما باید با پزشک خود درباره احتمال داشتن این مشکلات در طی یا بلافاصله بعد از PCI صحبت کنید:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• خونریزی</li> <li>• صدمه به رگهای خونی</li> <li>• درد</li> <li>• کبود شدگی</li> <li>• حساسیت نسبت به درد</li> <li>• نیاز فوری به CABG</li> </ul>	<p>شما باید با پزشک خود درباره احتمال داشتن این مشکلات در طی یا بلافاصله بعد از CABG صحبت کنید:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• عفونت.</li> <li>• درد</li> <li>• مشکلات کلیه.</li> <li>• مشکلات ریتم قلب (فیبریلاسیون دهلیزی)</li> <li>• مشکلات کوتاه-مدت فکری، حافظه، افسردگی، و اضطراب</li> </ul>	<p>سایر خطرات سلامتی</p>
<p>زمان انتظار لازم نیست</p>	<p>تعداد زیادی از بیماران می‌توانند بلافاصله پس از تحقیقات آنژیوگرافی خود PCI داشته باشند</p>	<p>مگر اینکه معالجه فوری برای حفظ جان شما لازم باشد، شما باید برای انجام جراحی خود در انتظار بمانید</p>	<p>زمان انتظار شما باید برای دریافت CABG انتظار بکشید، و ممکن است در طی این مدت نیاز باشد برای ملاقات‌ها به بیمارستان رفت و آمد کنید</p>

فقط تجویز داروها	PCI + داروها	CABG + داروها	ریسک ها/معایب احتمالی
<p>پیچیدن نسخه های داروی شما در داروخانه برایتان هزینه پولی خواهد داشت</p>	<p>PCI به تنهایی برای شما هیچ هزینه ای نخواهد داشت، به غیر از مدت زمان غیبت از خانه و مرخصی از کار (معمولا کمتر از CABG). پیچیدن نسخه های داروی شما در داروخانه برایتان هزینه پولی خواهد داشت</p>	<p>CABG به تنهایی برای شما هیچ هزینه ای نخواهد داشت، به غیر از مدت زمان غیبت از خانه و مرخصی از کار. پیچیدن نسخه های داروی شما در داروخانه برایتان هزینه پولی خواهد داشت</p>	<p>هزینه های شخصی برای هر یک از درمانها پرداخت هزینه دارو(ها) به عهده شماست، مگر اینکه بوسیله یک برنامه مزایای بهداشتی پوشش داشته باشید. بستگی به محل زندگی شما، ممکن است لازم باشد برای رفت و آمد به ملاقات های خود هزینه زمانی و پولی بپردازید</p>
<p>به زمان بازیابی احتیاجی نیست، اگرچه عادت کردن به اینکه دارو(های) جدیدتان چه احساسی در شما بوجود می آورند، ممکن است مدتی طول بکشد</p>	<p>بیشتر افراد حدود 5 روز پس از PCI قادر به بازگشتن به فعالیت های عادی خود می باشند</p>	<p>شما احتمالا 5-10 روز در بیمارستان می مانید شما به مدت 4 هفته قادر به رانندگی کردن نخواهید بود ممکن است 6-12 هفته طول بکشد تا شما بتوانید به فعالیت های عادی خود، از جمله کار، فعالیت جنسی و وظایف خانگی بازگردید</p>	<p><b>بهبود یافتن</b> زمان بازیابی سلامت پس از معالجه با CABG بسیار طولانی تر از PCI می باشد</p>

<sup>1</sup><https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673618304239?via%3Dihub>

<sup>2</sup><http://www.onlinejacc.org/content/68/10/985>

<sup>3</sup><https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735109717307155?via%3Dihub>

<sup>4</sup><https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1211585>